

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АЛЬФАЗОКС ALFASOXX

Раствор для приема внутрь

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2017/5664 от 03.08.2023

Производитель

Биофарма С.р.л., Италия Biofarma S.r.l,
Via Castelliere, 2 33036 Mereto di Tomba
(UD), Italy **СОСТАВ**

Раствор для приема внутрь Аль- фазокс,
1 флакон 200 мл с мерной чашечкой, в
упаковке 1 флакон.

ОПИСАНИЕ

Прозрачная жидкость янтарно-желтого
цвета с фруктовым запахом. pH: 5,00 ±
0,2. Плотность: 1,10 ± 0,05. Вязкость: 0-
150 ц/с

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Медицинское изделие Альфазокс
действует механически, обеспечивая
быстрое устранение симптомов,
обусловленных гастроэзофагеальной
рефлюксной болезнью (ГЭРБ).
Гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь (ГЭРБ) характеризуется такими
симптомами как изжога, кислотный
рефлюкс либо некилотный (смешанный,
щелочной) рефлюкс, кашель и дисфония,
которые могут быть связаны с наличием
эрозивных дефектов слизистой
пищевода. Выраженность симптомов
ГЭРБ часто усиливает-

ся в положении на спине, поэтому
состояние пациентов ухудшается в
ночное время.

Комбинация гиалуроновой кислоты и
хондроитина сульфата обеспечивает
защиту слизистой оболочки желудка и
пищевода. Наличие в составе
Альфазокс компонента «Полоксамер
407», обладающего высокой способно-
стью к биоадгезии, обеспечивает
надёжный контакт комплекса «ги-
алуроновая кислота - хондроитина
сульфат» с поверхностью стенки
пищевода, способствуя её защите от
агрессивного воздействия соляной
кислоты желудка. Хондроитина сульфат
также способствует восстановлению
слизистой оболочки пищевода и
желудка. Альфазокс способствует
снижению воспаления и заживлению
эрозий слизистой при эзофагитах и
гастродуоденитах.

ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Лечение гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не рекомендуется применять
Альфазокс в случаях известной или
подозреваемой повышенной
чувствительности к любому его
компоненту.

Не рекомендуется применять Альфазокс
беременным и кормящим женщинам, так
как соответствующие исследования не
проводились.

Нет известных взаимодействий с
препаратами для приёма внутрь.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


Нельзя превышать рекомендованную
дозу. Если симптомы ГЭРБ сохраняются,
или возникли нежелательные явления,
необходимо обратиться к врачу. Нельзя
применять после истечения срока
годности, указанного на упаковке. Не
замораживать. Хранить в недоступном
для детей месте.

Ингредиенты: натрия гиалуронат,
хондроитина сульфат натрия, ксилитол
С, полоксамер 407, поливи-
нилпирролидон, бензоат натрия, сорбат
калия, ароматизатор, вода.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением взболтать
содержимое флакона. Отмерить дозу с
помощью мерной чашечки, имеющейся в
упаковке. Принимать по 10 мл внутрь
после основных приёмов пищи и перед
сном или в соответствии с
рекомендациями врача.

ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ

Символ	Значение
	Производитель

	Номер партии
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению.
	Температурный диапазон
	Ознакомьтесь с инструкцией по применению
	Использовать до

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от +5 °С до
+30 °С. Не замораживать.

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Утилизируется как домашний мусор.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

ПОКУПАТЕЛЕЙ

ООО «Альфасигма Рус»
115054 Россия, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Замоскворечье,
пл. Павелецкая, д.2 стр. 2, этаж 10
Тел/факс: +7 (495) 150-01-23, эл. адрес:
info.ru@alfasigma.com
Юридическое лицо, на имя которого
выдано регистрационное удо-
стоверение: Alfasigma S.p.A., Via
Ragazzi del 99', 5, 40133 Bologna,
Италия

ALFASIGMA 

45003035